

Fulphila®

Pegfilgrastim

Fulphila patient information

Läs noga igenom bipacksedeln innan du
börjar använda detta läkemedel.



▼ Detta läkemedel är föremål för
utökad övervakning

Vad Fulphila är och vad det används för

Fulphila innehåller den aktiva substansen pegfilgrastim. Pegfilgrastim är ett protein som med hjälp av bioteknik produceras i en bakterie som kallas E. coli. Det tillhör en grupp proteiner som kallas cytokiner och det är mycket likt ett naturligt protein (granulocytkolonistimulerande faktor) som produceras i kroppen. Fulphila används för att minska tiden av neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) och förekomsten av febril neutropeni (lågt antal vita blodkroppar med samtidig feber) som kan bero på användningen av cytotoxisk kemoterapi (läkemedel som förstör snabbt växande celler). De vita blodkropparna är viktiga, eftersom de hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Dessa blodkroppar är mycket känsliga för kemoterapi och denna behandling kan leda till att deras antal minskar i kroppen. Om antalet vita blodkroppar sjunker till en låg nivå finns det kanske inte tillräckligt många kvar i kroppen för att bekämpa bakterier och då kan du bli mer mottaglig för infektioner. Din läkare har gett dig Fulphila för att hjälpa din benmärg (den del i skelettet där blodkroppar bildas) att bilda fler vita blodkroppar som hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Fulphila är avsett för vuxna som är 18 år eller äldre.

Vad du behöver veta innan du använder Fulphila

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Hur du ger dig själv injektioner med Fulphila

Din läkare kan besluta att det bästa för dig är att själv injicera Fulphila. Din läkare eller sjuksköterska visar hur du ger dig själv injektioner. Försök inte att själv injicera om läkaren eller sjuksköterskan inte har visat dig hur du ska göra. För mer information om hur du ger dig själv injektioner med pegfilgrastim, vänligen läs bifogad användaranvisning. Skaka inte Fulphila kraftigt eftersom det kan påverka dess effekt.

Om du har använt för stor mängd av Fulphila

Om du använder mer Fulphila än vad du borde kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att använda Fulphila

Om du har glömt din dos med Fulphila bör du kontakta din läkare för att diskutera när du bör injicera nästa dos. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Steg 1: Förberedelse inför injektion

A. Ta ut tråget med den förfyllda sprutan från ytterförpackningen och samla ihop de saker du behöver för din injektion: spritservetter, bommulstussar eller kompresser, plåster och en behållare för stickande och skärande avfall (medföljer ej).

- För en behagligare injektion låt den förfyllda sprutan ligga i rumstemperatur i cirka 30 minuter före injektion.
- Tvätta dina händer noggrant med tvål och vatten.
- Lägg den förfyllda sprutan och övrig utrustning på en ren plats med god belysning.

- Försök inte att värma den förfyllda sprutan med hjälp av en värmekälla såsom varmt vatten eller mikrovågsugn.
- Låt inte den förfyllda sprutan ligga i direkt solljus.
- Skaka inte den förfyllda sprutan.
- Förvara den förfyllda sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

B. Öppna tråget genom att dra av skyddet. Greppa över nålskyddet för att lyfta ur den förfyllda sprutan från tråget.




Av säkerhetsskäl:

- Greppa inte på kolven
- Lyft inte i den grå nålshylsan.

C. Kontrollera läkemedlet och den förfyllda sprutan.

- Kontrollera utgångsdatum på den förfyllda sprutans etikett (EXP). Använd den inte om datumet har passerat den sista dagen i den månad som anges.
- Det kan finnas en liten luftbubbla i den förfyllda sprutan. Du behöver inte ta bort luftbubblan före injektion. Det är riskfritt att injicera lösningen med luftbubblan.



- Använd inte den förfyllda sprutan om:
 - Läkemedlet är grumligt eller innehåller partiklar. Det ska vara en klar och färglös vätska.
 - Någon del verkar sprucken eller trasig.
 - Den grå nålshylsan saknas eller sitter löst.
 - Den sista dagen i den månad som anges som utgångsdatum på etiketten har passerat.


I samtliga fall ska du kontakta läkare eller sjukvårdspersonal.

Steg 2: Val av injektionsställe

A. Tvätta händerna noggrant. Förbered och rengör injektionsstället.

Lämpliga injektionsställen:

- Övre delen av låren.
- Buken, dock ej närmre naveln än 5 centimeter.
- Utsidan av överarmarna (endast om någon annan ger dig injektionen).




Rengör injektionsstället med en spritservett. Låt huden torka.

- Rör inte injektionsstället före injektionen.
- Injicera inte i områden där huden ömmar, har blåmärken, är röd eller hård. Undvik att injicera i områden med ärr eller bristningar.

B. Dra varsamt av den grå nålhylsan rakt ut och bort från kroppen.

- Rör inte nålen.
- Tryck inte på sprutkolven.




C. Nyp ihop huden runt injektionsstället för att få en stadig yta.

- Det är viktigt att hålla huden ihopnypt under hela injektionen.

Steg 3: Injektion av Fulphila (pegfilgrastim) injektionsvätska


A. Fortsätt att nypa ihop huden. Stick in nålen i huden.



- Rör inte det rengjorda hudområdet.


B. Tryck in kolven långsamt med konstant tryck tills du känner eller hör ett "klick".

- Tryck hela vägen genom "klicket".
- Det är viktigt att trycka igenom "klicket" för att hela dosen ska injiceras.



C. Släpp tummen från kolven. Lyft sedan bort sprutan från huden.

- Efter att du släppt kolven kommer nålskyddet att täcka nålen.



- Sätt inte tillbaka nålhylsan på den använda förfyllda sprutan.

Steg 4: Hur du kastar den förfyllda sprutan och kontrollerar injektionsstället.

A. Kasta den använda förfyllda sprutan och annat material i behållaren för stickande och skärande avfall.

- Läkemedel ska kastas i enlighet med lokala bestämmelser. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
- Förvara sprutan och behållaren för stickande och skärande avfall utom syn- och räckhåll för barn.



- Återanvänd inte den förfyllda sprutan.
- Återvinn inte förfyllda sprutor och kasta dem inte bland hushållsavfall.

B. Kontrollera injektionsstället.

Om det blöder kan du trycka en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället. Gnid inte på injektionsstället. Vid behov kan du sätta på ett plåster.

Hur Fulphila ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blistret och sprutetiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas. Fulphila kan användas om lösningen varit oavsiktligt nedfrost i mindre än 24 timmar vid ett tillfälle. Förvara förpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Du kan ta ut Fulphila ur kylskåpet och förvara i rumstemperatur (högst 30°C) under högst 3 dagar. När en spruta har tagits ur kylskåpet och nått rumstemperatur (högst 30 °C) måste den användas inom 3 dagar eller kastas. Använd inte detta läkemedel om det är grumligt eller innehåller partiklar. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Fulphila injektionsinstruktionerna

Bekanta dig med injektionsinstruktionerna (tillgängliga endast på finska)
<https://www.biosimilaariopas.fi/fi-fi/tervetuloo-fulphila>



Avläs QR-koden

På webbplatsen Biosimilaariopas.fi kan du enkelt hitta behandlingsstödmateriel på ett ställe. Loggar in med Vnr-koden som finns på paketet.

Anteckningar

[illegible]